Smile League DENTAL
815-782-6243
3330 MALL LOOP DRIVE, #A / JOLIET, IL. 60431

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS PARA CORONAS Y PUENTES

Primera visita para colocación de corona o puente y corona/puente provisional:

Durante su visita de hoy, se preparó uno o más de sus dientes para la colocación de una corona o puente. Debido a la anestesia, la zona estará adormecida y podría permanecer así durante algunas horas (hasta cinco horas). Tenga cuidado al masticar de ese lado de la boca o de ambos lados (si se le anestesiaron ambos lados de la mandíbula hoy), para evitar morderse el labio, la lengua o la mejilla.

Tiene una corona provisional. Las coronas provisionales se cementan con un cemento provisional para facilitar su extracción en su próxima cita. Tenga cuidado al masticar y evite alimentos duros, especialmente pegajosos, de ese lado, ya que podrían romperse o desprenderse antes de su próxima visita. Si se le cae la corona provisional, guarde el fragmento y contáctenos lo antes posible para que se la recomendemos sin costo alguno. Si se le cae la corona temporal y no regresa para que le coloquen una nueva, existe la posibilidad de que el diente se fracture y se produzcan complicaciones, como la imposibilidad de restaurarlo con una corona.

Después de la preparación de una corona, es normal sentir cierta molestia, especialmente si también se le realizó un alargamiento de corona. Durante el procedimiento, suele haber cierta alteración en los tejidos circundantes. Es normal que la encía alrededor del diente esté dolorida o sensible. Por lo general, esto sanará por sí solo; le recomendamos enjuagarse la zona afectada con agua tibia con sal. Esté atento a cualquier signo de dolor intenso, pulsaciones en el diente o dificultad para dormir durante varios días, ya que esto puede indicar una infección dental.

Segunda visita para la colocación de una corona o puente temporal:
Durante su visita de hoy se le entregará su corona o puente permanente. Las coronas y puentes permanentes se cementan con cemento permanente. Es muy

importante que esté conforme con la sensación y el tono de su corona antes de que esta sea cementada.

Una vez cementada la corona definitiva, se recomienda evitar alimentos pegajosos durante las primeras 24 horas. Después de ese tiempo, podrá comer, beber y realizar la limpieza dental de forma habitual. Si al morder siente que la oclusión no es uniforme, comuníquese con nosotros lo antes posible; los puntos de contacto excesivamente altos pueden causar dolor o dañar el diente tratado.

Si tiene alguna otra pregunta o inquietud, por favor comuníquese con nuestro consultorio al (815) 782-6243.