Smile League DENTAL
815-782-6243
3330 MALL LOOP DRIVE, #A / JOLIET, IL. 60431

Instrucciones posoperatorias para el tratamiento de conducto

Hoy ha comenzado o finalizado un tratamiento de conducto. Aunque algunos de los procedimientos de conducto que realizamos se completan en una sola visita, es posible que el tratamiento requiera más de una cita para finalizarse. Debido a la anestesia utilizada, la zona se encuentra adormecida, y este efecto puede prolongarse durante algunas horas (hasta cinco horas). Por favor, tenga cuidado al masticar —ya sea en el lado afectado o en ambos lados, si se le aplicó anestesia en ambos lados de la mandíbula— para evitar morderse el labio, la lengua o la mejilla.

Para proteger el diente y ayudar a mantener el empaste provisional en su lugar, le recomendamos evitar el consumo de alimentos duros o pegajosos, así como intentar masticar por el otro lado de la boca. Es posible que su diente haya sido rebajado para evitar que entre en contacto o choque con otros dientes al cerrar la boca; esto se debe a que se encuentra más debilitado que el resto y corre el riesgo de fracturarse.

Por lo general, una vez finalizado el tratamiento de conducto, el último paso consiste en la colocación de una corona. La corona protegerá el diente para evitar que se fracture en el futuro. Le recomendamos encarecidamente que programe una nueva cita para la colocación de la corona, tal como comentamos durante la presentación de su plan de tratamiento.

Si tiene alguna otra pregunta o inquietud, comuníquese con nuestro consultorio al (815) 782-6243.